

OMS reduce el tiempo de aislamiento para pacientes con covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció sobre reducción en el tiempo recomendado de aislamiento para los pacientes con covid-19, que baja así de trece a diez días para los que presenten síntomas y de diez a cinco para los asintomáticos.

Además, en su nueva guía de la gestión clínica en la pandemia, la OMS sugiere el uso de test rápidos de antígenos con el fin de reducir hasta en tres días el periodo de aislamiento, según presentó en rueda de prensa la responsable del programa de respuesta a la covid-19 de la OMS, Janet Díaz.

Los cambios se recomiendan tras analizar los resultados de 12 estudios con 2 mil 799 pacientes, en los que la reducción del aislamiento produjo un bajo incremento en casos graves que requiriesen hospitalización (del 2 por mil en el caso de pacientes asintomáticos y del 19 por mil en aquéllos que tuvieron síntomas).

«Se espera que la mayor parte de las personas prefieran periodos de aislamiento más cortos y que esto tenga positivos efectos económicos y sociales», destacó la experta.

En el apartado de terapias recomendadas, el único cambio es la expansión del uso recomendado del medicamento antiviral nirmatrelvir-ritonavir (comercializado por Pfizer bajo el nombre de Paxlovid), cuyo uso desde ahora también se considera una opción para mujeres embarazadas o lactantes con covid-19.

EFE